

# Der Einfluß von Diathermie, heißem Bad und Gehen auf den Volhardschen Wasserversuch.

---

## Dissertation

zur

## Erlangung der Doktorwürde

der

medizinischen Fakultät

der

Hessischen Ludwigs-Universität zu Gießen

vorgelegt von

**Emil Schäfer**

aus Worms-Hochheim am Rhein

Gießen 1933

Gedruckt mit Genehmigung der medizinischen Fakultät zu Gießen

Referent: Priv.-Doz. Dr. med. H. E. Büttner.

## Der Einfluß von Diathermie, heißem Bad und Gehen auf den Volhardschen Wasserversuch.

In seiner Einleitung zu der Arbeit „Der Wasserversuch und seine klinische Bedeutung“ weist Lebermann (1) darauf hin, daß es sich beim Wasserversuch um eine der einfachsten Funktionsprüfungen der klinischen Diagnostik handelt, und daß er trotzdem Aufschluß gibt über die wichtigsten Nierenfunktionen, nämlich über die Wasserausscheidung, die Verdünnungs- und Konzentrationsfähigkeit. So leicht die Ausführung allerdings ist, so kompliziert sind die theoretischen Grundlagen. Es kommt das daher, daß die letzten Zusammenhänge zwischen Nieren, Geweben, Funktion der Capillaren, Zustand der Bluteiweißkörper und der chemischen Zusammensetzung des Blutes überhaupt noch keine vollkommene und einheitliche Erklärung gefunden haben.

Weiterer Aufschluß über die Nierenfunktion war zu erhoffen von der Kontrolle der Ausscheidung unter verschiedenen Bedingungen. Wir haben deshalb den Einfluß von Diathermie, heißem Bad und Gehen auf den Volhardschen W.V. bei Kranken und Gesunden untersucht.

In der ersten Versuchsreihe wurde der Einfluß der Diathermie auf die Nierenfunktion bei Nierengesunden und -kranken untersucht.

In der D.m.W. vom 9. 1. 1931 spricht Ewig (2) über Diathermiebehandlung bei Nierenentzündung. Während er bei chronischen Nierenerkrankungen fast keinen Einfluß feststellte, konnte er auf Grund mehrerer Versuche ihre günstige sekretionsfördernde Wirkung bei akuten Nierenentzündungen mit stockender Sekretion, Ödemen und eklamptischen Zuständen nachweisen. Zur Erklärung weist Ewig auf den hohen O-Verbrauch der Niere hin, der bei gesteigerter Diurese noch um das 5-fache steigen kann, und der eine gute Durchblutung voraussetzt. Da außerdem experimentell nachgewiesen ist, daß bei der akuten Nephritis die Nieren-Durchblutung außerordentlich vermindert ist, und daß schon bei kurzdauernder Störung der Durchblutung z. B. durch Gefäßkompression eine langdauernde Oligurie oder gar Anurie einsetzt, so leuchtet

es ein, daß weitgehende Beziehungen zwischen Nierendurchblutung und Nierensekretion bestehen. Schon aus früheren Versuchen geht hervor, daß die gesunde Niere auf Diathermie mit vermehrter Sekretion von flüssigen und körperlichen Bestandteilen antwortet.

Dasselbe findet auch Ewig in seinen Versuchen. Er weist weiter nach, daß bei Diathermie einer Niere und bei getrenntem Auffangen des Urins mittels Ureterkatheter die durchwärmte Niere zu lebhafter Diurese angeregt wird, daß aber auch die andere Niere vermehrt ausscheidet, allerdings in geringem Maße. Das erstere erklärt Ewig durch Tiefenwirkung der Wärmestrahlen, das letztere durch reflektorische Vorgänge. Da Ewig von der Voraussetzung ausging, daß es sich bei der akuten Nephritis weniger um eine Entzündung mit Hyperämie, als um eine Drosselung der Gefäße handle, hat er hauptsächlich in akuten Fällen Diathermie verordnet und zwar mit bestem Erfolg.

Zur Nachprüfung der Angaben Ewigs gingen wir folgendermaßen vor:

Die Patienten, die wir schon mehrere Tage vorher durch geregelte und gleichmäßige Nahrungs- und Flüssigkeitszufuhr vorbereitet hatten, bekamen um 7 Uhr morgens nüchtern 1500 ccm dünnen Tee. Es wurde dann jede Stunde Urinmenge und spezifisches Gewicht bestimmt bis 11 Uhr. Mittags bekamen die Patienten ein trockenes Mittagessen. Ab 11 Uhr wurde der Urin 2-stündlich gemessen bis 19 Uhr. Beim Wasserversuch mit Diathermie wurden kurz nach dem Trinken beide Nieren 30 Min. diathermiert und zwar bis zu 3 Ampère.

Dabei zeigte sich, daß bei Nierengesunden die erste Harnportion erheblich anstieg und zwar bei den 5 untersuchten Fällen im Durchschnitt von 450 auf 710 ccm, während die zweite Harnportion eine Verringerung um etwa 150 ccm zeigte. Wir sahen also eindeutig, daß die Niere auf Diathermie sofort mit vermehrter Sekretion antwortet. Dabei wurde auch an festen Bestandteilen absolut mehr ausgeschieden (s. Tab. I u. Kurve I.) Auch bei 4 Patienten mit Nephritis hatten wir in 3 Fällen dasselbe Bild. Nur Fall 4, bei dem die Wasserausscheidung auch sonst sehr schlecht war, schied weniger aus nach Diathermie. Er reagierte mit starken Schweißen, allgemeinem Unbehagen und geringer Wasserausscheidung von allerdings erhöhtem spezifischem Gewicht (s. Tab. II u. Kurve II.).

Tabelle I.

- |    |                                                          |
|----|----------------------------------------------------------|
| 1. | Durchschnittswerte von 5 Gesunden mit u. ohne Diathermie |
| 2. | „ „ 4 „ mit u. ohne Bad                                  |
| 3. | „ „ 4 „ mit u. ohne Gehen                                |

|    |             | 7-8 h | 8-9  | 9-10 | 10-11 | 11-1 | 1-3  | 3-5  | 5-7  |
|----|-------------|-------|------|------|-------|------|------|------|------|
| 1. | ohne Diath. | 450   | 475  | 384  | 95    | 75   | 83   | 82   | 79   |
|    |             | 1002  | 1001 | 1003 | 1013  | 1020 | 1020 | 1024 | 1026 |
|    | mit Diath.  | 710   | 319  | 159  | 78    | 84   | 104  | 99   | 95   |
|    |             | 1002  | 1003 | 1008 | 1016  | 1021 | 1022 | 1027 | 1026 |
| 2. | ohne Bad    | 438   | 409  | 496  | 108   | 79   | 170  | 86   | 60   |
|    |             | 1003  | 1003 | 1003 | 1010  | 1013 | 1017 | 1023 | 1025 |
|    | mit Bad     | 638   | 469  | 313  | 188   | 114  | 105  | 119  | 70   |
|    |             | 1004  | 1001 | 1005 | 1009  | 1017 | 1018 | 1022 | 1021 |
| 3. | ohne Gehen  | 501   | 550  | 436  | 94    | 76   | 165  | 58   | 54   |
|    |             | 1003  | 1002 | 1003 | 1010  | 1015 | 1018 | 1025 | 1025 |
|    | mit Gehen   | 534   | 638  | 381  | 181   | 141  | 105  | 63   | 45   |
|    |             | 1004  | 1001 | 1003 | 1009  | 1016 | 1019 | 1025 | 1025 |

Vergleich der Durchschnittswerte der innerhalb 24 Stunden ausgeschiedenen Harnmengen von 4 Gesunden beim


| einfach. Wasservers. | Diatherm. | Bad  | Gehen |
|----------------------|-----------|------|-------|
| 1824                 | 1619      | 1973 | 2006  |
| 1012                 | 1012      | 1012 | 1011  |

Tabelle II.


Die Ausscheidungen bei 4 Patienten mit Nephritis mit und ohne Diathermie:

1. A. B.: Nephritis subacuta mit nephrotischer Komponente
2. H. F.: „ „
3. G. B.: „ „ mit Neigung zu Sklerose
4. G. Sch.: „ „ mit nephrotischer Komponente

|    |             | 7-8 h | 8-9  | 9-10 | 10-11 | 11-1 | 1-3  | 3-5  | 5-7  |
|----|-------------|-------|------|------|-------|------|------|------|------|
| 1. | ohne Diath. | 375   | 625  | 125  | 125   | 90   | 95   | 95   | 75   |
|    |             | 1004  | 1002 | 1004 | 1006  | 1014 | 1020 | 1020 | 1020 |
|    | mit Diath.  | 500   | 500  | 250  | 125   | 160  | 120  | 70   | 65   |
|    |             | 1005  | 1001 | 1003 | 1006  | 1015 | 1024 | 1020 | 1020 |
| 2. | ohne Diath. | 500   | 625  | 80   | 60    | 125  | 85   | 125  | 75   |
|    |             | 1004  | 1000 | 1004 | 1010  | 1005 | 1010 | 1014 | 1014 |
|    | mit Diath.  | 625   | 125  | 45   | 40    | 110  | 125  | 150  | 85   |
|    |             | 1002  | 1003 | 1008 | 1012  | 1016 | 1014 | 1018 | 1018 |
| 3. | ohne Diath. | 250   | 245  | 175  | 115   | 150  | 170  | 190  | 150  |
|    |             | 1003  | 1002 | 1005 | 1006  | 1007 | 1009 | 1008 | 1007 |
|    | mit Diath.  | 375   | 250  | 250  | 100   | 150  | 275  | 125  | 225  |
|    |             | 1004  | 1001 | 1003 | 1004  | 1010 | 1008 | 1006 | 1009 |
| 4. | ohne Diath. | 250   | 125  | 40   | 85    | 30   | 65   | 35   | 30   |
|    |             | 1005  | 1005 | 1004 | 1014  | 1020 | 1026 | 1026 | 1028 |
|    | mit Diath.  | 135   | 50   | 65   | 55    | 30   | 60   | —    | 80   |
|    |             | 1010  | 1020 | 1010 | 1022  | 1030 | 1030 | —    | 1032 |



Kurve zu den Durchschnittswerten von 5 Gesunden der Tabelle I



Kurve zu Fall 2 der Tabelle II

Fall 1: A. B., 56 J. Diagnose: Nephritis im Abklingen mit nephrotischem Einschlag.

Seit August 1930 klagt Patient zeitweise über Schmerzen in beiden Nierengegenden. 14 Tage nach den ersten Beschwerden trat Schwellung beider Beine links mehr wie rechts auf. Dabei habe der Urin dunkel und trüb ausgesehen.

Befund: Blasser, 159 cm großer, 57,1 kg schwerer Mann. Bei der Aufnahme keine Ödeme. Innere Organe o. B. Nierengegend beiderseits druckempfindlich, Prostata etwas vergrößert. Wassermannsche Reaktion negativ. RR 125/65 mm Hg. Rest-N 39 mg  $\%$ , Indikan im Blut negativ. Urin: Alb. ++, Sach. — Urob. —, Urobg. (+), Ind. —, Sed.: viel Erythr., wenig Leuko. Esbach 3  $\%$ .

Im Verlauf schwankt der Esbach zwischen 3 und 9 pro mille, die Senkung zwischen 18 und 25 mm pro Stunde. Im Sediment traten granulierte Zylinder auf, die Erythrozyten wurden weniger. Der Wasserversuch zeigte annähernd normale Werte, nach Diathermie ging die Ausscheidung in die Höhen.

Fall 2: H. F., 19 J. Diagnose: Glomerulonephritis subacuta. Dezember 1930 hatte Patient eine Halsentzündung, die gut ausheilte. Kurz danach zeigten sich Schwellungen an den Beinen und im Urin Eiweiß.

Befund: Kräftiger junger Mann von 164 cm Größe und 55,8 kg Gewicht. Keine Ödeme. Innere Organe o. B. RR 125/75. Wassermannsche Reaktion neg. Urin: Alb. ++; Sed. Leuko. und Erythro., sonst o. B. Esbach  $\frac{3}{4}\%$ , Rest-N 35 mg, Indikan im Blut neg. Blutsenkung 37 mm Hg.

Im Verlauf traten vereinzelt granulierte Zylinder auf, der RR ging nicht über 130, Albumen nach Esbach ging auf  $\frac{1}{4}\%$  herunter. Der Wasserversuch zeigte annähernd normale Verhältnisse. Nach Diathermie ging die Ausscheidung zunächst in die Höhe, um bei der zweiten Portion ziemlich stark abzufallen.

Fall 3: G. B., 17 J. Diagnose: Nephritis subacuta mit Neigung zu Sklerose.

Erkrankte im Herbst 1930 zunächst mit Kopfschmerzen, steifem Gefühl in den Beinen und Sehstörungen. Hierzu kam starke Schwellung der Beine, Polyurie und Nykturie.

Befund: Blaß aussehendes Mädchen, mäßige Durchblutung der Schleimhäute, teigige Schwellung der Haut, mäßige Ödeme an den Beinen. Innere Organe o. B. Linke Nierengegend leicht druckempfindlich. Doppelseitige Retinitis albuminurica. — Wassermannsche Reaktion neg. RR 150/100 mm Hg. Urin: Alb. +, Sach. —, Ub. —, Ubg. —, Ind. —, Sed. reichlich Erythro., viel Leuko. und Epithelien. Rest-N 64,4 mg  $\%$ , Indikan im Blut pos. Im Verlauf änderte sich der Blutdruck nicht mehr. Der Wasserversuch zeigte geringe Ausscheidung

bei einem spezifischen Gewicht von nur 1010 auch im Trockenversuch. Nach Diathermie stieg die Ausscheidung ohne wesentliche Änderung des spezifischen Gewichts.

Fall 4: Ch. Sch., 38 J. Diagnose: Nephritis subacuta mit nephritischer Komponente.

Erkrankte Ende September 1930 mit Schwellungen an Händen, Beinen, Gesicht und Genitale. Der Urin soll dabei spärlich und trübe gewesen sein.

Befund: Blasser Mann von 165 cm Größe und 72,5 kg Gewicht. Mäßige teigige Schwellung des Gesichts und Lid-ödem. Sonst keine Ödeme. Innere Organe o. B. Wassermannsche Reaktion neg. RR 155/80, Rest-N 40 mg Hg. Indikan im Blut neg. Urin: Alb. ++, Sed. reichlich Erythro., Leuko. und vereinzelt hyaline Zylinder, sonst o. B. Esbach 6 ‰.

Im Verlauf schwanken die Eiweißmengen zwischen 5 und 8 ‰, die Blutsenkungen zwischen 20 und 24 mm Hg. pro Stunde. Die Urinmenge schwankt zwischen 350 und 750 ccm täglich, Diuretika haben keinen Einfluß. Das spezifische Gewicht bewegt sich zwischen 1020 und 1030. Die Erythrozyten gingen im Sediment zurück, reichlich hyaline Zylinder traten auf. Der Blutdruck sank auf 140/80 mm Hg. Dieser Fall war wie schon erwähnt, der einzige, der nach Diathermie weniger ausschied als beim einfachen Wasserversuch.

Wir können also aus unseren Versuchen den Schluß ziehen, daß Diathermie nicht nur bei Gesunden, sondern auch bei den Nierenkranken, bei denen keine erhebliche Ödembereitschaft bestand, die Niere zu vermehrter Sekretion anregt. Bei schwerer Schädigung vermag allerdings auch die Diathermie nichts wesentliches zu erreichen wie Fall 4 zeigt.

In der zweiten Versuchsreihe verglichen wir die Nierenfunktion nach heißem Bad mit der Ausscheidung beim einfachen Wasserversuch. Dabei ließen wir die Patienten, nachdem sie den Tee getrunken hatten,  $\frac{1}{2}$  Stunde in 37–38° heißem Wasser baden. Auch hier haben wir ein ähnliches Bild wie bei der Diathermie. Nach dem Bad schieden alle Fälle, Gesunde wie Kranke, mehr Urin aus mit Ausnahme von Fall 4, derselbe, der auch auf Diathermie mit Verminderung der Urinmenge reagierte (s. Tab. I u. III u. Kurve III).

Die Regelmäßigkeit des Ergebnisses steht hier im Gegensatz zu einer Arbeit von Brütt (3): „Über die Beeinflussung von Harnmenge und spezifischem Gewicht durch Schwitzprozeduren“. Er wollte die Patienten so stark schwitzen lassen, daß sie nach der Prozedur verminderten, aber dafür konzentrierten Harn ausscheiden, um so eine für den praktischen Arzt leicht und in kurzer Zeit ausführbare Nierenfunktionsprüfung zu haben. Das gewünschte Ergebnis erhielt er auch in einem Teil der Fälle, darunter auch bei Versuchen mit

heißem Bad. In einem anderen Teil allerdings ging die Urinmenge sogar in die Höhe, also dasselbe Ergebnis, wie wir es mit einer Ausnahme in allen Fällen fanden.— Zur Erklärung des letzten Ergebnisses weist Brütt auf die Ansicht Schwenkenbechers hin, der eine bestimmte Korrelation zwischen Haut und Nierenarteriolen annimmt und zwar sollen sich bei warmer Haut die Nierengefäße erweitern, bei kalter Haut zusammenziehen. Diese Ansicht können wir nach unseren Versuchen bestätigen. Wenn sich die Versuche Brütts nur zum Teil mit den unseren decken, so mag das an einer anderen Versuchsanordnung liegen oder aber daran, daß in der Poliklinik der Status der Patienten vor den Versuchen schwer zu kontrollieren war.

Unsere Versuche wurden an folgenden Patienten angestellt:

Fall 1: A. B. (siehe oben, Seite 7),

Fall 2: H. F. (siehe oben, Seite 7),

Fall 3: D. K. (5 J. Diagnose: Nephritis subacuta mit Neigung zu Nephrose).

November 1930 an Schwellung beider Fußknöchel erkrankt. Dabei fühlte sie sich krank und matt. Befund: blasses Mädchen, Gesicht etwas gedunsen, sonst keine Ödeme. RR 125/80, Urin: Alb. ++, Sed. viel Leukoz., wenig Erythrozyten, sonst o. B. Rest-N 38 mg, Indikan im Blut: pos. Auch hier ging die etwas schlechte Ausscheidung beim Wasserversuch mit Bad in die Höhe. Dabei stieg auch das spezifische Gewicht an.

Fall 4: Ch. Sch. (siehe oben, Seite 8).

Tabelle III.

Ausscheidung von 4 Patienten mit Nephritis mit und ohne Bad:

1. A. B.: Nephritis subacuta mit nephrotischer Komponente

2. H. F.: „ „

3. D. K.: „ „ mit Neigung zu Nephrose

4. Ch. Sch.: „ „ mit nephrotischer Komponente

|    |          | 7-8 h | 8-9  | 9-10 | 10-11 | 11-1 | 1-3  | 3-5  | 5-7  |
|----|----------|-------|------|------|-------|------|------|------|------|
| B. | ohne Bad | 375   | 625  | 125  | 125   | 90   | 95   | 95   | 75   |
|    |          | 1004  | 1002 | 1004 | 1006  | 1014 | 1020 | 1020 | 1020 |
|    | mit Bad  | 625   | 375  | 125  | 85    | 85   | 90   | 70   | 55   |
|    |          | 1002  | 1001 | 1002 | 1010  | 1014 | 1014 | 1020 | 1020 |
| F. | ohne Bad | 500   | 625  | 80   | 60    | 125  | 85   | 125  | 75   |
|    |          | 1004  | 1000 | 1004 | 1010  | 1005 | 1010 | 1014 | 1014 |
|    | mit Bad  | 875   | 375  | 85   | 65    | 55   | 105  | 85   | 75   |
|    |          | 1002  | 1001 | 1006 | 1012  | 1014 | 1014 | 1014 | 1020 |

|      |          | 7-8 h | 8-9  | 9-10 | 10-11 | 11-1 | 1-3  | 3-5  | 5-7  |
|------|----------|-------|------|------|-------|------|------|------|------|
| K.   | ohne Bad | 150   | 275  | 275  | 175   | 125  | 100  | 50   | 250  |
|      |          | 1007  | 1003 | 1001 | 1002  | 1009 | 1014 | 1020 | 1024 |
|      | mit Bad  | 210   | 390  | 345  | 260   | 225  | —    | 160  | 40   |
|      |          | 1007  | 1005 | 1004 | 1007  | 1010 | —    | 1025 | 1020 |
| Sch. | ohne Bad | 250   | 125  | 40   | 85    | 30   | 65   | 35   | 30   |
|      |          | 1005  | 1005 | 1004 | 1014  | 1020 | 1026 | 1026 | 1028 |
|      | mit Bad  | 150   | 50   | 30   | —     | 30   | 70   | 90   | 60   |
|      |          | 1012  | 1016 | 1018 | —     | 1022 | 1024 | 1026 | 1028 |

In der dritten Versuchsreihe kontrollierten wir die Ausscheidung nach Gehen, und zwar bei Gesunden, bei Nierenkranken und bei Herzkranken. Wir ließen die Patienten kurz nach dem Trinken eine Stunde gehen und dann wieder ins Bett legen. Dabei stellten wir fest, daß bei Gesunden in 9 Fällen von 10 nach Gehen mehr Urin ausgeschieden wurde als beim einfachen Wasserversuch. Dabei war auch noch die zweite Urinportion, also eine Stunde nach dem Gehen, vermehrt. Das spezifische Gewicht zeigte keine wesentlichen Schwankungen. Bei dem einzigen Fall, bei dem keine vermehrte Sekretion eintrat, waren die Nieren o. B. Auch das Herz zeigte auskultatorisch und röntgenologisch keine pathologischen Veränderungen, die Funktion war jedoch nicht ganz einwandfrei. Bei der Herzfunktionsprüfung trat Beruhigung erst nach 5 Min. ein, und bei anstrengender Arbeit bekam der Patient starke Atemnot. Vielleicht können wir das Ausbleiben der bei den anderen 9 Fällen gefundenen Reaktion hierauf zurückführen (s. Tab. IV).

Ganz ähnlich war das Ergebnis bei 4 Nierenkranken. In 3 Fällen stieg die Ausscheidung unmittelbar nach Gehen, in einem Fall davon auch noch 2 Stunden nach dem Gehen. Der 4. Fall, der am schwersten Nierenkranke, derselbe, der auch nach Diathermie und Bad vermindert ausschied, sezernierte nach Gehen bedeutend weniger Urin, wobei auch noch das spezifische Gewicht herunterging.

Während dem letzten also das Gehen sehr schlecht bekam, sehen wir, daß leicht Nierenkranke wenigstens im Bezug auf die Ausscheidung das Gehen gut vertragen (siehe Tab. V und Kurve IV).

Tabelle IV.

Ausscheidungen ohne und mit Gehen bei 10 Nieren- und Herzgesunden.

|    |            | 7-8 h | 8-9  | 9-10 | 10-11 | Gesamtmenge |
|----|------------|-------|------|------|-------|-------------|
| L. | ohne Gehen | 375   | 375  | 625  | 90    | 1465        |
|    |            | 1002  | 1005 | 1001 | 1014  | 1003        |
|    | mit Gehen  | 375   | 625  | 625  | 375   | 2000        |
|    |            | 1016  | 1001 | 1002 | 1006  | 1005        |

|                 | 7-8 h | 8-9  | 9-10 | 10-11 | Gesamtmenge |
|-----------------|-------|------|------|-------|-------------|
| G. ohne Gehen   | 375   | 625  | 775  | 50    | 1485        |
|                 | 1001  | 1001 | 1000 | 1002  | 1001        |
| mit Gehen       | 375   | 625  | 625  | 100   | 1725        |
|                 | 1003  | 1000 | 1002 | 1010  | 1002        |
| K. ohne Gehen   | 625   | 700  | 120  | 65    | 1510        |
|                 | 1003  | 1002 | 1009 | 1020  | 1006        |
| mit Gehen       | 760   | 800  | 125  | 24    | 1709        |
|                 | 1003  | 1001 | 1008 | 1019  | 1002        |
| K. ohne Gehen   | 630   | 500  | 375  | 170   | 1675        |
|                 | 1004  | 1001 | 1001 | 1004  | 1001        |
| mit Gehen       | 625   | 500  | 400  | 195   | 1720        |
|                 | 1002  | 1002 | 1001 | 1001  | 1002        |
| R. ohne Gehen   | 265   | 500  | 240  | 105   | 1110        |
|                 | 1004  | 1001 | 1005 | 1010  | 1005        |
| mit Gehen       | 375   | 750  | 250  | 45    | 1420        |
|                 | 1005  | 1002 | 1006 | 1020  | 1005        |
| Sch. ohne Gehen | 250   | 500  | 400  | 200   | 1350        |
|                 | 1008  | 1004 | 1004 | 1006  | 1004        |
| mit Gehen       | 375   | 400  | 625  | 500   | 1900        |
|                 | 1004  | 1006 | 1002 | 1004  | 1004        |
| O. ohne Gehen   | 250   | 375  | 130  | —     | 750         |
|                 | 1002  | 1001 | 1001 | —     | 1002        |
| mit Gehen       | 250   | 450  | 150  | 120   | 975         |
|                 | 1002  | 1001 | 1002 | 1006  | 1002        |
| H. ohne Gehen   | 200   | 500  | 250  | 80    | 1030        |
|                 | 1004  | 1001 | 1005 | 1010  | 1005        |
| mit Gehen       | 250   | 500  | 150  | 175   | 1075        |
|                 | 1004  | 1003 | 1012 | 1014  | 1008        |
| L. ohne Gehen   | 600   | 300  | 100  | 125   | 1125        |
|                 | 1003  | 1003 | 1008 | 1009  | 1003        |
| mit Gehen       | 375   | 750  | 200  | 175   | 1500        |
|                 | 1002  | 1001 | 1002 | 1004  | 1002        |
| R. ohne Gehen   | 525   | 275  | 230  | 145   | 1175        |
|                 | 1003  | 1002 | 1002 | 1004  | 1003        |
| mit Gehen       | 475   | 375  | 150  | 120   | 1120        |
|                 | 1001  | 1003 | 1004 | 1004  | 1003        |

Tabelle V.

Ausscheidungen bei 4 Patienten mit Nephritis mit und ohne Gehen:

1. A. B.: Nephritis subacuta mit nephrotischer Komponente,
2. H. F.: „ „
3. W. Sch.: „ „
4. Ch. Sch.: „ „ „ „ „

|                 | 7-8 h | 8-9  | 9-10 | 10-11 | 11-1 | 1-3  | 3-5  | 5-7  |
|-----------------|-------|------|------|-------|------|------|------|------|
| B. ohne Gehen   | 375   | 625  | 125  | 125   | 90   | 95   | 95   | 75   |
|                 | 1001  | 1002 | 1004 | 1006  | 1014 | 1020 | 1020 | 1020 |
| mit Gehen       | 500   | 375  | 250  | 70    | 70   | 95   | 65   | 55   |
|                 | 1001  | 1000 | 1001 | 1010  | 1018 | 1018 | 1020 | 1020 |
| F. ohne Gehen   | 500   | 625  | 80   | 60    | 125  | 85   | 125  | 75   |
|                 | 1004  | 1000 | 1004 | 1010  | 1005 | 1010 | 1014 | 1014 |
| mit Gehen       | 625   | 375  | 375  | 80    | 55   | 55   | 60   | 55   |
|                 | 1002  | 1000 | 1002 | 1006  | 1018 | 1020 | 1020 | 1020 |
| Sch. ohne Gehen | 375   | 500  | 625  | 250   | 120  | 115  | 55   | 60   |
|                 | 1004  | 1002 | 1000 | 1004  | 1014 | 1018 | 1022 | 1022 |
| mit Gehen       | 250   | 625  | 750  | 250   | 125  | 120  | 125  | 75   |
|                 | 1005  | 1002 | 1000 | 1004  | 1010 | 1010 | 1012 | 1020 |
| Sch. ohne Gehen | 500   | 450  | 345  | 180   | 80   | 165  | 135  | 60   |
|                 | 1003  | 1003 | 1004 | 1004  | 1020 | 1016 | 1016 | 1028 |
| mit Gehen       | 235   | 200  | 125  | 50    | 35   | 130  | 40   | 25   |
|                 | 1006  | 1002 | 1000 | 1008  | 1024 | 1010 | 1022 | 1024 |

Tabelle VI.

Die innerhalb 4 Stunden ausgeschiedenen Harnmengen von 5 Herzkranken ohne und mit Gehen:

1. L. B.: Mitralinsuffizienz
2. A. O.: Myodegeneratio incipiens
3. H. B.: Aortensklerose
4. A. S.: Adipositas schwersten Grades
5. K. S.: Myodegeneratio cordis.

|                  | 7-8 h | 8-9  | 9-10 | 10-11 |
|------------------|-------|------|------|-------|
| H. B. ohne Gehen | 510   | 580  | 285  | 125   |
|                  | 1005  | 1003 | 1007 | 1010  |
| mit Gehen        | 350   | 395  | 65   | 30    |
|                  | 1007  | 1008 | 1012 | 1022  |
| A. O. ohne Gehen | 775   | 475  | 230  | 150   |
|                  | 1004  | 1003 | 1010 | 1012  |
| mit Gehen        | 600   | 325  | 110  | 50    |
|                  | 1003  | 1005 | 1011 | 1020  |
| L. B. ohne Gehen | 615   | 745  | 47   | 30    |
|                  | 1002  | 1001 | 1010 | 1020  |
| mit Gehen        | 207   | 570  | 95   | 28    |
|                  | 1007  | 1002 | 1010 | 1020  |
| A. S. ohne Gehen | 482   | 132  | 78   | 68    |
|                  | 1004  | 1007 | 1011 | 1013  |
| mit Gehen        | 120   | 30   | 17   | 15    |
|                  | 1016  | 1021 | 1030 | 1032  |

|       |            | 7-8 h | 8-9  | 9-10 | 10-11 |
|-------|------------|-------|------|------|-------|
| K. S. | ohne Gehen | 500   | 625  | 125  | 90    |
|       |            | 1002  | 1001 | 1003 | 1010  |
|       | mit Gehen  | 400   | 300  | 115  | 55    |
|       |            | 1004  | 1002 | 1008 | 1012  |

Fall 1: siehe oben, A. B., Seite 7,


Fall 2: H. F.: siehe oben, Seite 7,

Fall 3: W. Sch. Diagnose: Nephritis subacuta.


Im Dezember 1930 erkrankte Patient an Halsschmerzen, die von Diphtherie herrühren sollten. 3 Wochen danach wurde im Urin Eiweiß gefunden. Das Gesicht war gedunsen.

Befund: Kräftiger Mann von 170 cm Größe und 65,5 kg Gewicht. Innere Organe o. B. RR 135/80 Urin: Alb. ++, Sed. wenig Erythro. Leuko. und Zylinder. Esbach 2 ‰, Rest-N 20 mg ‰, Indikan im Blut negativ. Blutsenkung 23 mm Hg. Die Wasserausscheidung war normal, nach Gehen stieg sie bei der zweiten und dritten Portion.


Kurve III



Kurve von Fall 2 der Tabelle III



Kurve eines nierenkranken Patienten (Fall 3, Tabelle V)



Kurve eines Herzkranken  
(Fall 2, Tabelle VI)

**Fall 4: Ch. Sch. (siehe oben, Seite 8).**

Ganz anders war das Ergebnis bei Herzkranken. Schon bei Patienten mit leichter Erkrankung des Herzens, die sich oft nur in geringer funktioneller Störung zeigte, ging die Ausscheidung nach Gehen nicht nur nicht in die Höhe, sondern oft sogar ganz bedeutend herunter. Gerade in den ersten Portionen nach dem Gehen zeigte sich die Herabsetzung gegenüber dem einfachen Wasserversuch im Liegen. Am besten vergleichen wir an Hand der Fälle die gesamte ausgeschiedene Urinmenge des einfachen Wasserversuchs mit der nach Gehen (siehe Tabelle VI und Kurve V).

**Fall 1: L. B. Diagnose: Mitralinsuffizienz.**

1929 an Gelenkrheumatismus erkrankt, daran anschließend Schmerzen in der Herzgegend, Herzklopfen und Schwellung der Beine. Nach anfänglicher Besserung erneutes Auftreten dieser Beschwerden im März 1931.

Befund: Frau von 156 cm Größe und 66,4 kg Gewicht, gut genährt und kräftig, keine Ödeme. Cor verbreitert, links 2 Querfinger über die Medioclavikularlinie, rechts 1 cm über den Sternalrand reichend. Über allen Herzabschnitten ein systolisches Geräusch. Puls 72 Schläge pro Min., Temp. 36,4. Innere Organe sonst o. B. RR 136/80 Urin ohne pathologischen Befund. Das E. K. G. ergab: in Ableitung 2 Nachschwankung etwas hoch, in Ableitung 3 Negativität. Der Wasserversuch ergab: gesamte nach 24 Stunden ausgeschiedene Menge im Liegen:

1437

1004

nach 1 Stunde Gehen

900

1004

**Fall 2: A. O. 50 J. Diagnose: Myodegeneratio incipiens.**

War im Januar 1931 wegen Cor nervosum in der Klinik, kommt im März wieder wegen Herzbeschwerden schon bei geringen Anstrengungen.

Befund: Kräftiger Mann von 175 cm Größe und 89,4 kg Gewicht, Fettpolster ziemlich gut entwickelt. Innere Organe o. B. RR 120/80, Urin ohne pathologischen Befund. Herz-funktionsprüfung: nach mittlerer körperlicher Arbeit kehrt der Puls nur langsam zur Norm zurück, es kommt zur Urobilinogen-ausscheidung im Urin, und der RR sinkt von 110/80 auf 85/60. E. K. G.: Negativität der R-Zacke in Ableitung 2. Der Wasserversuch ergab:

im Liegen: 1630

1006

nach Gehen: 1085

1006

Fall 3: H. B., 52 J. Diagnose: Aortensklerose.

Seit 1915 leide Patient schon an Atembeschwerden, die sich sehr verschlimmert hätten. Bei geringen Anstrengungen bekomme er Atemnot, Erstickungsanfälle und Herzklopfen.

Befund: 189 cm groß, 62,5 kg schwerer Mann. Innere Organe o. B. Urin ohne pathologischen Befund. RR 91/65.

Das E. K. G. zeigt rhythmischen Verlauf. Bei der Herz-funktionsprüfung sinkt der RR von 105/75 auf 95/85, es kommt zur Urobilin- und Urobilinogenausscheidung, und es treten Extrasystolen auf.

Der Wasserversuch ergibt:

|            |             |
|------------|-------------|
| im Liegen: | <u>1500</u> |
|            | 1004        |
| im Gehen:  | <u>840</u>  |
|            | 1008        |

Fall 4: A. S., 49 J. Diagnose: Adipositas schwersten Grades.

Seit 1904 nach einer Geburt klagt die Patientin über Herzbeschwerden, Herzklopfen und Beklemmungsgefühl. Seit 1928 allmähliche Verschlimmerung und Auftreten von Schwindelanfällen.

Befund: Sehr dicke Frau von 104,6 kg Gewicht und 124 cm Größe, starke Ausbildung der Fettpolster. Cor röntgenologisch etwas nach links verbreitert, Gefäßband kurz und breit, sonst innere Organe o. B. Im Urin Urobilin und Urobilinogen pos. RR 150/100.

Der Wasserversuch ergab:

|            |            |
|------------|------------|
| im Liegen: | <u>760</u> |
|            | 1006       |
| im Gehen:  | <u>182</u> |
|            | 1018       |

Fall 5: K. S., 47 J. Diagnose: Myodegeneratio cordis.

1915 hatte Patient Typhus. Danach klagte er über Luftmangel, Herzklopfen und Anfälle von Atemnot, die mit Schmerzen in der linken Brust einhergingen.

Befund: Kräftiger Mann in gutem Ernährungszustand. Herz klinisch o. B., röntgenologisch Aorta sehr verbreitert. E. K. G.: verlängerte Überleitungszeit zwischen Vorhof und Ventrikel, R-Zacke aufgesplittet, Terminalschwankung zum Teil neg. Innere Organe o. B.

Der Wasserversuch ergab:

|            |             |
|------------|-------------|
| im Liegen: | <u>1340</u> |
|            | 1005        |
| im Gehen:  | <u>870</u>  |
|            | 1006        |

Interessant ist zum Schluß der Vergleich der innerhalb 12 Stunden ausgeschiedenen Harnmengen im Liegen, mit Diathermie, mit Bad und mit Gehen. Eine Übersicht gibt Tabelle I, die die Durchschnittswerte von 4 Fällen mit normaler Wasserausscheidung zeigt. Dabei zeigt sich gegenüber dem einfachen Wasserversuch eine Verminderung bei Diathermie, was wir auf vermehrte Schweißabsonderung zurückführen, eine Vermehrung nach heißem Bad, was wir auf eine bessere Durchblutung der Niere, die aber wegen der Umgebung des nassen Elements nicht mit Schweißabgabe einhergeht, zurückführen. Eine noch stärkere Vermehrung finden wir nach Gehen, was wir ebenfalls auf eine Anregung der Zirkulation, die auch mit vermehrter Durchblutung der Nieren einhergeht, zurückführen. Das spezifische Gewicht zeigte keine wesentlichen Schwankungen.

Zusammenfassend können wir also sagen, daß die gesunde Niere auf Diathermie, auf heißes Bad und auf Gehen mit vermehrter Sekretion antwortet und zwar in ziemlich erheblichem Maß. Da die Nierensekretion abhängig ist von der Nierendurchblutung, so können wir schließen, daß die vermehrte Sekretion in unseren Fällen durch eine vermehrte Durchblutung bedingt ist. Wir können weiter feststellen, daß auch leicht Nierenkranken Diathermie, heißes Bad und Gehen nicht nur nicht schadet, sondern daß die Nierenfunktion sogar in günstigem Sinne beeinflußt wird. Dagegen fanden wir bei stärkerer Schädigung der Nierenfunktion, daß sowohl Diathermie als auch heißes Bad eher zu einer Verschlechterung als zu einer Besserung führte. Am allerwenigsten jedoch wurde Gehen vertragen. In Fällen von stärkerer Nierenschädigung können wir also von der strengen Bettruhe nicht abgehen, während leichte Fälle das Gehen gut vertragen.

Die Untersuchungen an Herzkranken ergaben, daß selbst Patienten mit keinen stärkeren Insuffizienzerscheinungen beim Wasserversuch mit einer Stunde Gehen gegenüber dem einfachen Wasserversuch ganz erheblich weniger ausschieden, und zwar nicht nur unmittelbar nach dem Gehen, sondern noch bis zu 3 und 4 Stunden danach. Da wir bei jedem der untersuchten 5 Herzkranken eine ganz erhebliche Verminderung der Ausscheidung nach Gehen fanden gegenüber dem Wasserversuch im Liegen, andererseits aber bei 9 Fällen von 10 Gesunden eine Erhöhung der ausgeschiedenen Harnmenge nach Gehen, so können wir annehmen, daß wir in dem Vergleich der beiden Wasserversuche im Liegen und nach Gehen ein sicheres diagnostisches Mittel haben, um auch leichte Herzschädigungen, die klinisch sonst kaum in Erscheinung treten, festzustellen.

## Literatur.

1. Lebermann: „Der Wasserversuch und seine klinische Bedeutung“.
  2. Ewlg: „Diathermie bei Nierenentzündung“ D. m. W. vom 9. 1. 31.
  3. Brütt: „Über die Beeinflussung von Harnmenge und spezifischem Gewicht durch Schwitzprozeduren“. Zentralblatt für innere Medizin, Jg. 1920.
- 

Zuletzt erfülle ich noch die angenehme Pflicht, meinem hochverehrten Lehrer, Herrn Geheimrat Professor Dr. Voit für die lebenswürdige Überlassung der Arbeit zu danken.

Auch Herrn Privatdozent Dr. Büttner bin ich für seine zahlreichen Anregungen und Ratschläge zu größtem Dank verbunden.

---

## Lebenslauf.

Ich, Emil Schäfer, Sohn des Bäckermeisters Franz Schäfer zu Worms-Hochheim, wurde am 1. Februar 1907 zu Worms-Hochheim geboren. Nach 3jährigem Besuch der Volksschule in Worms-Hochheim trat ich in das Gymnasium Worms ein, das ich Ostern 1925 mit Abitur absolvierte. Danach widmete ich mich dem Studium der Medizin und verbrachte 1 Semester in Heidelberg, 6 Semester in München, wo ich nach dem 5. die „Ärztliche Vorprüfung“ bestand. Nach weiteren 4 Semestern in Gießen beendete ich hier mein Studium mit der „Ärztlichen Staatsprüfung“ am 18. Dezember 1930. Ab 19. Dezember 1930 war ich in der Medizinischen Klinik, ab 1. Mai 1931 am Pathologischen Institut der Universität Gießen als Medizinalpraktikant tätig.

---

